

### Un vaccin efficace

La vaccination est la meilleure protection contre l'hépatite A.

### Un vaccin nécessaire

Chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes pour les protéger et interrompre la circulation du virus.

### Un vaccin simple

Une seule injection suffit pour protéger rapidement, la seconde dose pouvant être administrée ultérieurement.

### Un vaccin sans danger

Les réactions sont peu fréquentes et non graves.

**Pour tout autre renseignement,  
rendez-vous sur le site [vaccination-info-service.fr](http://vaccination-info-service.fr)  
rubrique > Les maladies et leurs vaccins / hépatite A**

**et sur le site [sexosafe.fr/vaccination](http://sexosafe.fr/vaccination)**

**HÉPATITE A  
en région  
Centre-Val de Loire**

**COMMENT JE ME  
PROTÈGE ?**

## Contre l'hépatite A il existe un vaccin efficace

Une personne peut être porteuse du virus de l'hépatite A sans présenter de symptômes mais la transmettre à son entourage proche.

Le meilleur moyen de vous protéger des infections sexuellement transmissibles est d'utiliser un préservatif.

**Une hausse du nombre de cas d'hépatite A a été observée depuis le début de l'année 2017 en région Centre-Val de Loire, dont une partie touchant la population gay et bisexuelle.**

### Qu'est-ce qu'une hépatite A ?

L'hépatite A est une infection du foie provoquée par un virus différent de celui de l'hépatite B ou C. Ce virus est présent dans les selles des personnes infectées. **Il se transmet lors de relations sexuelles par contact entre la bouche et des matières fécales, même présentes en très petite quantité, et notamment lors des pratiques anales.**

### Cette infection est-elle grave ?

L'hépatite A peut donner une grande fatigue pendant plusieurs semaines. Dans certains cas, elle peut évoluer vers une hépatite fulminante, forme très grave pouvant nécessiter une greffe du foie.

### Comment se protéger ?

Une bonne hygiène des mains est primordiale. Il est important de penser à se laver les mains après être allé aux toilettes et avant et après un rapport sexuel. La vaccination permet également de se protéger efficacement de cette infection, si elle est réalisée assez tôt après un contact avec une personne infectée.

**La vaccination est réalisée dans les Centres de vaccination et les Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) de la région**

**Rendez-vous dans un lieu de vaccination de la région**

#### CHER (18)

Centre hospitalier de Bourges - CeGGID  
145 avenue François Mitterrand  
18000 Bourges  
Tél. 02 48 48 49 40

Centre de vaccination  
485 route de Varye  
18230 Saint-Doulchard  
Tél. 02 48 27 28 15

#### EURE-ET-LOIR (28)

Centre hospitalier de Dreux - Centre de vaccination - CeGGID  
28102 Dreux Cedex  
Tél. 02 37 51 77 04

#### INDRE (36)

Centre de vaccination - IRSA de Châteauroux  
Centre Colbert - Bâtiment H  
1<sup>er</sup> étage - 2 place Eugène Rolland  
36000 Châteauroux  
Tél. 02 54 08 13 35

Centre hospitalier de Châteauroux  
216 avenue de Verdun  
36000 Châteauroux  
Tél. 02 54 29 66 78

#### INDRE-ET-LOIRE (37)

Centre de vaccination  
5 rue Jehan Fouquet  
37000 Tours  
Tél. 02 47 47 39 64

Centre hospitalier régional universitaire de Tours - CeGGID  
5 rue Jehan Fouquet  
37000 Tours  
Tél. 02 47 66 88 41

#### LOIR-ET-CHER (41)

Centre de vaccination  
Centre hospitalier de Blois - CeGGID  
Rez-de-chaussée  
Mail Pierre Charlot  
41000 Blois  
Tél. 02 54 55 67 69

#### LOIRET (45)

Hôpital de Gien  
Pôle de consultations  
2 avenue Jean Villejean  
45500 Gien  
Tél. 02 38 29 40 40

Centre hospitalier de Montargis  
Association Espace  
40 rue Périer  
45200 Montargis  
Tél. 02 38 95 16 05

Hôpital de Pithiviers  
Centre de vaccination  
Rez-de-chaussée  
Consultations externes  
10 boulevard Beauvallet  
45307 Pithiviers Cedex

Centre hospitalier régional d'Orléans - CeGGID  
1 rue Porte Madeleine  
Dispensaire de vaccination  
45000 Orléans  
Tél. 02 38 51 42 29 /  
02 38 74 45 54

Si possible, apportez votre carnet de vaccination